Programmation Fonctionnelle

Module du tronc commun "Mathématiques-Informatique" 1ère année

Cours du module PRF

Calculabilité des fonctions

Chapitre I

Fonctions récursives

Mes séances (Webex) de la période 22/04-03/06/2020 :

Cours + exercices (TD 1 et TD 2)

CHAPITRE I

Fonctions récursives

LES FONCTIONS DE BASE : λ -notation

- La Fonction zéro d'arité 0 : $Z = \lambda \bullet 0$
- La Fonction successeur d'arité 1 : $S = \lambda n \bullet n+1$
- Les Fonctions Projection d'arité n : $P_i^n = \lambda x_1 \dots x_i \dots x_n \bullet x_i$
 - ❖ ($n \geq 1$) et ($1 \leq i \leq n$)

CHAPITRE I

Fonctions récursives

LES FONCTIONS DE BASE : notation usuelle

- $Z : \begin{cases} \emptyset & \dashrightarrow IN \\ \vdash & \dashrightarrow 0 \end{cases}$

- ❖ $Z()=0$ **ou** $Z=0$

- $S : \begin{cases} IN & \dashrightarrow IN \\ n & \vdash \dashrightarrow n + 1 \end{cases}$

- ❖ $S(n)=n+1$

- $P_i^n : \begin{cases} IN^n & \dashrightarrow IN \\ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) & \vdash \dashrightarrow x_i \end{cases}$

- ❖ $P_i^n(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = x_i$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Règle de COMPOSITION :

- H fonction d'arité m
- $G_1, \dots, G_m$ m fonctions d'arité n
- Construire la fonction F d'arité n par composition à partir de H et $G_1, \dots, G_m$:

$$\mathbf{F} = \mathbf{H}^\circ(G_1, \dots, G_m)$$

$$\blacksquare \mathbf{F}(x_1, \dots, x_n) = [\mathbf{H}^\circ(G_1, \dots, G_m)](x_1, \dots, x_n)$$

$$= \mathbf{H}(G_1(x_1, \dots, x_n), \dots, G_m(x_1, \dots, x_n))$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Règle de COMPOSITION : cas particulier $m=1$ et $n=0$

- H fonction d'arité $m=1$ et G_1 m fonction d'arité $n=0$
- Construire la fonction F d'arité $n=0$ par composition à partir de H et G_1 :

$$\mathbf{F = H \circ G_1}$$

- $\mathbf{F() = [H \circ G_1]() = H(G_1()) = H(G_1)}$

- $\mathbf{F = H(G_1)}$

- $\mathbf{F = H \circ G_1 = \lambda.H(G_1)}$

- **Exemple** : $H = S$ et $G_1 = Z$

$$\rightarrow \begin{cases} F = H \circ G_1 = S \circ Z \\ F() = (S \circ Z)() = S(Z()) = S(Z) = S(0) = 1 \\ F = S \circ Z = \lambda.1 \end{cases}$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Règle de RECURSION :

- G fonction d'arité n
- H fonction d'arité n+2
- Construire la fonction F d'arité (n+1) par récursion à partir de G et H :

$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{IN}^n$

- $F(x_1, \dots, x_n, 0) = G(x_1, \dots, x_n)$
- $F(x_1, \dots, x_n, y+1) = H(x_1, \dots, x_n, F(x_1, \dots, x_n, y), y)$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Règle de RECURSION : cas particuliers $n=0$ et $n=1$

- **$n=0$** : G d'arité 0, H d'arité 2 et F d'arité 1
 - ❖ $F(\mathbf{0}) = G()$
 - ❖ $F(\mathbf{y}+1) = H(F(\mathbf{y}), \mathbf{y})$
- **$n=1$** : G d'arité 1, H d'arité 3 et F d'arité 2

$\forall \mathbf{x} \in \text{IN}$

- ❖ $F(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = G(\mathbf{x})$
- ❖ $F(\mathbf{x}, \mathbf{y}+1) = H(\mathbf{x}, F(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \mathbf{y})$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Règle de MINIMISATION :

- G une fonction d'arité $n+1$ telle que :
 $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n, \exists y \in \mathbb{N}$ tel que : $G(x_1, \dots, x_n, y) = 0$
- Construire la fonction F d'arité n par minimisation à partir de G :
 $F(x_1, \dots, x_n) = y$, avec y le plus petit entier tel que $G(x_1, \dots, x_n, y) = 0$

❖ **Exemple :** $\oplus = \lambda xy \bullet x+y$ peut être construite par minimisation à partir de
 $f = \lambda xyz. (x+y)/(z+1)$, avec / division entière. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{N}^2$, $z=x+y$ est le plus petit entier tel que $f(x, y, z) = 0$.

CHAPITRE I

Fonctions récursives

FONCTIONS PRIMITIVES RECURSIVES :

Une fonction est dite PRIMITIVE RECURSIVE (PR) si elle est :

- soit une fonction de base,
- soit une fonction construite à partir d'autres fonctions PR par application de la règle de composition ou de la règle de récursion.

FONCTIONS RECURSIVES :

Une fonction est dite RECURSIVE (R) si elle est :

- soit une fonction de base,
- soit une fonction construite à partir d'autres fonctions R par application de la règle de composition, de la règle de récursion ou de la règle de minimisation.

CHAPITRE I

Fonctions récursives

DERIVATION PR (R) :

Une fonction F est **PRIMITIVE RECURSIVE** (respectivement : **RECURSIVE**) s'il existe une suite finie de fonctions $F_1, \dots, F_n$ telles que :

- $F_n = F$
- Et pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$
 - soit F_i est une fonction de base,
 - soit il a été déjà prouvé que F_i est **PRIMITIVE RECURSIVE** (respectivement : **RECURSIVE**)
 - soit F_i est définie à partir de certaines des fonctions $F_1, \dots, F_{i-1}$ au moyen de la règle de composition ou de récursion (respectivement : la règle de composition ou de récursion ou de minimisation).

La suite des fonctions $F_1, \dots, F_n$ est appelée une dérivation **PRIMITIVE RECURSIVE** (respectivement : **RECURSIVE**) de F

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 1 : utiliser la règle de récursion pour montrer que chacune des trois fonctions est PR

$Z_1 = \lambda n.0$ d'arité 1 : trouver G d'arité 0 et H d'arité 2 telles que

- $Z_1(0) = G() = G$
- $Z_1(y+1) = H(Z_1(y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $Z_1(0) = 0 = Z$
- $Z_1(y+1) = 0 = Z_1(y) = P_1^2(Z_1(y), y)$

Z_1 PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = Z$ PR car de base
- $f_2 = P_1^2$ PR car de base
- $f_3 = Z_1$ PR : règle de récursion appliquée à $G = f_1$ et $H = f_2$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 1 :

$\oplus = \lambda xy. x+y$ d'arité 2 : trouver G d'arité 1 et H d'arité 3 telles que

- $\oplus(x,0) = G(x)$
- $\oplus(x,y+1) = H(x, \oplus(x,y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $\oplus(x,0) = x+0 = x = P_1^1(x)$
- $\oplus(x,y+1) = x+(y+1) = (x+y)+1 = S(\oplus(x,y)) = (S \circ P_2^3)(x, \oplus(x,y), y)$

$\oplus$ PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = P_1^1$, $f_2 = P_2^3$, $f_3 = S$ (f_1 , f_2 et f_3 PR car de base)
- $f_4 = f_3 \circ f_2$ PR : règle de composition appliquée à f_3 et f_2
- $f_5 = \oplus$ PR : règle de récursion appliquée à $G=f_1$ et $H=f_4$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 1 :

$\otimes = \lambda xy. x * y$ d'arité 2 : trouver G d'arité 1 et H d'arité 3 telles que

- $\otimes(x, 0) = G(x)$
- $\otimes(x, y+1) = H(x, \otimes(x, y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $\otimes(x, 0) = x * 0 = 0 = Z_1(x)$
- $\otimes(x, y+1) = x * (y+1) = (x * y) + x = \oplus(\otimes(x, y), x)$
 $= \oplus(P_2^3(x, \otimes(x, y), y), P_1^3(x, \otimes(x, y), y)) = [\oplus^\circ(P_2^3, P_1^3)](x, \otimes(x, y), y)$

$\otimes$ PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = Z_1, f_2 = \oplus, f_3 = P_1^3, f_4 = P_2^3$ (PR : montré ou de base)
- $f_5 = f_2^\circ(f_4, f_3)$ PR : règle de composition
- $f_6 = \otimes$ PR : règle de récursion appliquée à $G=f_1$ et $H=f_5$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 2 :

$Sg = \lambda x. \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$ d'arité 1 : trouver G d'arité 0 et H d'arité 2 telles que

- $Sg(0) = G() = G$
- $Sg(y+1) = H(Sg(y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $Sg(0) = 0 = Z$
- $Sg(y+1) = 1 = S(0) = S(Z_1(y)) = S(Z_1(P_2^2(Sg(y), y))) = (S \circ Z_1 \circ P_2^2)(Sg(y), y)$

Sg PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = Z, f_2 = S, f_3 = P_2^2, f_4 = Z_1$ PR (montré ou de base)
- $f_5 = f_4 \circ f_3, f_6 = f_2 \circ f_5$ PR (règle de composition)
- $f_7 = Sg$ PR : règle de récursion appliquée à $G = f_1$ et $H = f_6$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 2 :

$\text{Pred} = \lambda x. \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ x - 1 & \text{sinon} \end{cases}$ d'arité 1 : trouver G d'arité 0 et H d'arité 2 telles que

- $\text{Pred}(0) = G() = G$
- $\text{Pred}(y+1) = H(\text{Pred}(y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $\text{Pred}(0) = 0 = \mathbf{Z}$
- $\text{Pred}(y+1) = y = \mathbf{P}_2^2(\text{Pred}(y), y)$

Pred PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = \mathbf{Z}$ PR car de base
- $f_2 = \mathbf{P}_2^2$ PR car de base
- $f_3 = \text{Pred}$ PR : règle de récursion appliquée à $G = f_1$ et $H = f_2$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 3 :

1) Montrer que $C_k = \lambda.k$ est PR, pour toute constante $k \geq 0$?

Réponse : preuve par récurrence

- Pour $k=0$: $C_0 = \lambda.0 = Z \rightarrow$ PR car fonction de base
- Pour $k=1$: règle de composition appliquée à $H=S$ d'arité $m=1$ et $G_1=Z$ d'arité $n=0$
 - $F=S \circ Z = C_1$ d'arité $n=0$: $C_1() = C_1 = (S \circ Z)() = S(Z()) = S(Z) = S(0) = 1$
 - $C_1 = \lambda.1$ PR car S et Z PR
- **Hypothèse de récurrence :** pour tout $k \leq p$, $C_k = \lambda.k$ PR ($p \geq 1$)
- Montrons que $C_{p+1} = \lambda.p+1$ est PR
- Règle de composition appliquée à $H=S$ d'arité $m=1$ et $G_1=C_p$ d'arité $n=0$
 - $F=S \circ C_p = C_{p+1}$ d'arité $n=0$:
$$C_{p+1}() = C_{p+1} = (S \circ C_p)() = S(C_p()) = S(C_p) = S(p) = p+1$$
 - $C_{p+1} = \lambda.p+1$ PR car S et C_p PR
- La propriété restant vraie pour $k=p+1$, elle est vraie pour tout $k \geq 0$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 3 :

2) Montrer que $F_c = \lambda n.c$ est PR, pour toute constante c ?

Réponse :

- $F_c(0) = c = C_c = \lambda.c$
- $F_c(y+1) = c = F_c(y) = P_1^2(F_c(y), y)$

F_c PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = C_c$ PR (montré)
- $f_2 = P_1^2$ PR car de base
- $f_3 = F_c$ PR : règle de récursion appliquée à $G = f_1$ et $H = f_2$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 4 :

1) $\text{fact} = \lambda x. x !$ d'arité 1 : trouver G d'arité 0 et H d'arité 2 telles que

- $\text{fact}(0) = G() = G$
- $\text{fact}(y+1) = H(\text{fact}(y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $\text{fact}(0) = 1 = C_1 = \lambda. 1$
- $\text{fact}(y+1) = \text{fact}(y) * S(y) = [\otimes^\circ(P_1^2, S^\circ P_2^2)](\text{fact}(y), y)$

fact PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = C_1, f_2 = \otimes, f_3 = P_1^2, f_4 = P_2^2, f_5 = S$ PR (montré ou de base)
- $f_6 = f_5^\circ f_4, f_7 = f_2^\circ (f_3, f_6)$ PR (règle de composition)
- $f_8 = \text{fact}$ PR : règle de récursion appliquée à $G = f_1$ et $H = f_7$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 4 :

2) $\text{Puis} = \lambda xy. x^y$ PR ? Je reviendrai sur cette fonction après l'exercice 4 du TD 2.

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 4 :

3) $\overline{Sg} = \lambda x. \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ d'arité 1 : trouver G d'arité 0 et H d'arité 2 telles que

- $\overline{Sg}(0) = G() = G$
- $\overline{Sg}(y+1) = H(\overline{Sg}(y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $\overline{Sg}(0) = 1 = C_1 = \lambda.1$
- $\overline{Sg}(y+1) = 0 = Z_1(y) = (Z_1 \circ P_2^2)(\overline{Sg}(y), y)$

$\overline{Sg}$ PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = C_1, f_2 = Z_1, f_3 = P_2^2$ PR (montré ou de base)
- $f_4 = f_2 \circ f_3$ PR (règle de composition)
- $f_5 = \overline{Sg}$ PR : règle de récursion appliquée à $G = f_1$ et $H = f_4$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 5 :

1) $F = \lambda xy. \sum_{k=0}^y D(x, k)$ d'arité 2 : trouver G d'arité 1 et H d'arité 3 telles que

- $F(x, 0) = G(x)$
- $F(x, y+1) = H(x, F(x, y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $F(x, 0) = \sum_{k=0}^0 D(x, k) = D(x, 0) = [D \circ (P_1^1, Z_1)](x)$
- $F(x, y+1) = \sum_{k=0}^{y+1} D(x, k) = D(x, y+1) + \sum_{k=0}^y D(x, k)$
 $= D(x, y+1) + F(x, y)$
 $= (\oplus [D \circ (P_1^3, S \circ P_3^3), P_2^3])(x, F(x, y), y)$

F PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1 = P_1^1, f_2 = P_1^3, f_3 = P_2^3, f_4 = P_3^3, f_5 = S, f_6 = Z_1, f_7 = \oplus, f_8 = D$
- $f_9 = f_8 \circ (f_1, f_6), f_{10} = f_5 \circ f_4, f_{11} = f_8 \circ (f_2, f_{10}), f_{12} = f_7 \circ (f_{11}, f_3)$
- $f_{13} = F$ PR : règle de récursion appliquée à $G = f_9$ et $H = f_{12}$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 5 :

2) $f(x)=0+x+2x+3x+\dots+x^2$ PR ?

Réponse :

$$f(x)=\sum_{k=0}^x \otimes(x, k)=F(x,x)=[F^\circ(P_1^1, P_1^1)](x)$$

f PR grâce à la dérivation PR :

- $f_1=F$ PR (montré)
- $f_2=P_1^1$ PR PR car de base
- $f_3=f$ PR : règle de composition appliquée à $H=f_1$, $G_1=f_2$ et $G_2=f_2$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 1 :

1) $\text{moins} = \lambda xy. \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ d'arité 2 $\rightarrow$ **règle de récursion** : trouver G d'arité 1 et H d'arité 3 telles que

- $\text{moins}(x, 0) = G(x)$
- $\text{moins}(x, y+1) = H(x, \text{moins}(x, y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $\text{moins}(x, 0) = x - 0 = x = P_1^1(x)$
- $\text{moins}(x, y+1) = \begin{cases} x - (y + 1) & \text{si } x \geq y + 1, \\ 0 & \text{si } x < y + 1 \end{cases} = \begin{cases} (x - y) - 1 & \text{si } x - y \geq 1, \\ 0 & \text{si } x - y < 1 \end{cases}$
 $= \begin{cases} (x - y) - 1 & \text{si } x - y > 0, \\ 0 & \text{si } x - y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \text{moins}(x, y) - 1 & \text{si } \text{moins}(x, y) > 0, \\ 0 & \text{si } \text{moins}(x, y) = 0 \end{cases}$
 $= \text{Pred}(\text{moins}(x, y)) = [\text{Pred} \circ P_2^3](x, \text{moins}(x, y), y)$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 1 :

2) $\min = \lambda_{xy} \cdot \begin{cases} x & \text{si } x < y, \\ y & \text{si } x \geq y \end{cases}$ d'arité 2 $\rightarrow$ **règle de composition** : trouver H d'arité 2 et G_1, G_2 d'arité 2 telles que

- $\min(x,y) = [H^\circ(G_1, G_2)](x,y)$
- H, G_1 et G_2 PR

Réponse :

$$\begin{aligned} \bullet \quad \min(x,y) &= \begin{cases} x & \text{si } x < y, \\ y & \text{si } x \geq y \end{cases} = \begin{cases} x - 0 & \text{si } x < y, \\ y + x - x & \text{si } x \geq y \end{cases} = \begin{cases} x - 0 & \text{si } x < y, \\ x - (x - y) & \text{si } x \geq y \end{cases} \\ &= x - \begin{cases} 0 & \text{si } x < y, \\ x - y & \text{si } x \geq y \end{cases} = x - \text{moins}(x,y) = \text{moins}(x, \text{moins}(x,y)) \\ &= [\text{moins}^\circ(P_1^2, \text{moins})](x,y) \end{aligned}$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 2 :

1a) $\text{Abs} = \lambda xy. |x-y|$ d'arité 2 $\rightarrow$ règle de composition : trouver H d'arité 2 et G_1, G_2 d'arité 2 telles que

- $\text{Abs}(x,y) = [H^\circ(G_1, G_2)](x,y)$
- H, G_1 et G_2 PR

Réponse :

- $$\begin{aligned} \text{Abs}(x,y) &= \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y, \\ y - x & \text{si } y \geq x \end{cases} = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y, \\ 0 & \text{si } y \geq x \end{cases} + \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq y, \\ y - x & \text{si } y \geq x \end{cases} \\ &= \text{moins}(x,y) + \text{moins}(y,x) \\ &= [\oplus^\circ(\text{moins}, \text{moins}^\circ(P_2^2, P_1^2))](x,y) \end{aligned}$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 2 :

1b) $\max = \lambda xy.$ maximum(x,y) d'arité 2 $\rightarrow$ règle de composition : trouver H d'arité 2 et G_1, G_2 d'arité 2 telles que

- $\max(x,y) = [H^\circ(G_1, G_2)](x,y)$
- H, G_1 et G_2 PR

Réponse :

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \max(x,y) &= \begin{cases} x & \text{si } x > y, \\ y & \text{si } x \leq y \end{cases} = x^* \begin{cases} 1 & \text{si } x > y, \\ 0 & \text{si } x \leq y \end{cases} + y^* \begin{cases} 0 & \text{si } x > y, \\ 1 & \text{si } x \leq y \end{cases} \\
 &= x^* \begin{cases} 1 & \text{si moins}(x,y) > 0, \\ 0 & \text{si moins}(x,y) = 0 \end{cases} + y^* \begin{cases} 0 & \text{si moins}(x,y) > 0, \\ 1 & \text{si moins}(x,y) = 0 \end{cases} \\
 &= x^* \text{Sg}(\text{moins}(x,y)) + y^* \overline{\text{Sg}}(\text{moins}(x,y)) \\
 &= [\oplus^\circ [\otimes^\circ (P_1^2, \text{Sg}^\circ \text{moins}), \otimes^\circ (P_2^2, \overline{\text{Sg}}^\circ \text{moins})]](x,y)
 \end{aligned}$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 2 :

2) $\max_n = \lambda x_1 \dots x_n. \text{maximum}(x_1, \dots, x_n)$ d'arité $n \geq 2$ PR ? **Par récurrence :**

Réponse :

- $n=2$: $\max_2 = \max$ PR
- **HR** : propriété vraie jusqu'à $k \geq 2 \rightarrow \forall n \leq k, \max_n$ PR
- Montrons que la propriété reste vraie pour $n=k+1$: **règle de composition**
- $\max_{k+1}(x_1, \dots, x_{k+1}) = \max(\max_k(x_1, \dots, x_k), x_{k+1})$

$$= (\max^\circ [\max_k^\circ (P_1^{k+1}, \dots, P_k^{k+1}), P_{k+1}^{k+1}]) (x_1, \dots, x_{k+1})$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 3 :

1) $r_2 = \lambda x. x \bmod 2$ d'arité 1 : trouver G d'arité 0 et H d'arité 2 telles que

- $r_2(0) = G() = G$
- $r_2(y+1) = H(r_2(y), y)$
- G et H PR

Réponse :

- $r_2(0) = 0 \bmod 2 = 0 = Z$
- $r_2(y+1) = (y+1) \bmod 2 = \begin{cases} 1 & \text{si } r_2(y) = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

$$= \overline{Sg}(r_2(y))$$

$$= (\overline{Sg} \circ P_1^2)(r_2(y), y)$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 3 :

2) $q_2 = \lambda x.x \text{ div } 2$ d'arité 1 : trouver G d'arité 0 et H d'arité 2 telles que

- $q_2(0)=G()$
- $q_2(y+1)=H(q_2(y),y)$
- G et H PR

Réponse :

- $q_2(0)=0 \text{ div } 2=0=\mathbf{Z}$
- $q_2(y+1)=(y+1) \text{ div } 2 = \begin{cases} q_2(y) & \text{si } r_2(y) = 0 \\ q_2(y) + 1 & \text{sinon} \end{cases} = q_2(y) + \begin{cases} 0 & \text{si } r_2(y) = 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$
 $= q_2(y) + Sg(r_2(y))$
 $= [\oplus^\circ(P_1^2, Sg^\circ r_2^\circ P_2^2)](q_2(y), y)$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 4 :

$$\text{div_t} = \lambda xy. \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0, \\ y \text{ div } x & \text{sinon} \end{cases} \text{ PR ? Règle de récursion}$$

$$\text{div_t}(x,0)=0=\mathbf{Z_1}(x)$$

$$\text{div_t}(x,y+1)=\begin{cases} 0 & \text{si } x = 0, \\ \text{div_t}(x,y) + 1 & \text{si } y + 1 = (\text{div_t}(x,y) + 1) * x, \\ \text{div_t}(x,y) & \text{sinon} \end{cases}$$

$$= \text{Sg}(x) * [\text{div_t}(x,y) + \overline{\text{Sg}}(\text{moins}(\otimes(\text{S}(\text{div_t}(x,y)),x),\text{S}(y)))]$$

$$= [\otimes^\circ(\text{Sg}^\circ P_1^3, \oplus^\circ(P_2^3, \overline{\text{Sg}}^\circ \text{moins}^\circ(\otimes^\circ(\text{S}^\circ P_2^3, P_1^3), \text{S}^\circ P_3^3)))](x, \text{div_t}(x,y), y)$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 4 :

$$\text{reste_t} = \lambda_{xy} \cdot \begin{cases} y & \text{si } x = 0, \\ y \bmod x & \text{sinon} \end{cases} \text{ PR ? Règle de composition}$$

$$\text{reste_t}(x,y) = \begin{cases} y & \text{si } x = 0, \\ y \bmod x & \text{sinon} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} y & \text{si } x = 0, \\ \text{moins}(y, \otimes(x, \text{div_t}(x,y))) & \text{sinon} \end{cases}$$

$$= \text{moins}(y, \otimes(x, \text{div_t}(x,y)))$$

$$= [\text{moins}^\circ(P_2^2, \otimes^\circ(P_1^2, \text{div_t}))](x,y)$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 1 Exercice 4 : La fonction Puis_t est le prolongement à $\mathbb{N}^2$ de la fonction $\text{Puis} = \lambda xy. x^y$

$$2) \text{Puis_t} = \lambda xy. \begin{cases} 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \\ x^y & \text{sinon} \end{cases} \text{ PR ?}$$

$$\text{Puis_t}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y = 0, \\ x * x^{y-1} & \text{sinon} \end{cases}$$

Règle de récursion :

- $\text{Puis_t}(x, 0) = 1 = (\mathbf{S} \circ \mathbf{Z}_1)(x)$
- $\text{Puis_t}(x, y+1) = x * \text{Puis_t}(x, y) = [\mathbf{\otimes} \circ (\mathbf{P}_1^3, \mathbf{P}_2^3)](x, \text{Puis_t}(x, y), y)$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Récurivité des ensembles

Fonction caractéristique :

Soit A un sous-ensemble de IN^p . La fonction caractéristique de A , par rapport à IN^p , permet de distinguer les éléments de A des autres éléments de IN^p . Elle est définie comme suit :

$$\text{Car}_A = \lambda_{x_1 \dots x_p} \begin{cases} 1 & \text{si } (x_1, \dots, x_p) \in A, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Récurivité des ensembles

Définition :

Soit A un sous-ensemble de IN^p . A est primitif récursif (respectivement récursif) si sa fonction caractéristique Car_A est primitive récursive (respectivement récursive).

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Récurtivité des ensembles

Décidabilité d'un ensemble –définition :

Soit A un sous-ensemble de IN^p . A est décidable s'il existe un algorithme (une procédure effective) permettant de décider, pour tout élément $(x_1, \dots, x_p)$ de IN^p , si $(x_1, \dots, x_p)$ appartient à A .

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Récurtivité des ensembles

Décidabilité d'un ensemble –proposition :

Soit A un sous-ensemble de IN^p . A est décidable s'il est récursif (en particulier, s'il est primitif récursif).

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Réversivité des ensembles

Semi-décidabilité :

Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{N}$. A est réversivement énumérable (ou semi-décidable) s'il existe une fonction récursive

$$f = \lambda x_1 \dots x_p. f(x_1, \dots, x_p)$$

telle que

$$A = \{ y \in \mathbb{N} : \exists (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{N}^p \text{ t.q. } f(x_1, \dots, x_p) = y \}.$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Réversivité des ensembles

Semi-décidabilité (généralisation) :

Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{N}^q$. A est réversivement énumérable (ou semi-décidable) s'il existe une fonction récursive

$$f = \lambda x_1 \dots x_p. f(x_1, \dots, x_p)$$

telle que

$$A = \{ (y_1, \dots, y_q) \in \mathbb{N}^q : \exists (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{N}^p \text{ t.q. } f(x_1, \dots, x_p) = (y_1, \dots, y_q) \}.$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Récurtivité des relations

Fonction caractéristique :

Soit R une relation définie sur IN^p (on dit aussi fonction p -aire définie sur IN). La fonction caractéristique de R , par rapport à IN^p , permet de distinguer les éléments vérifiant R des autres éléments de IN^p . Elle est définie comme suit :

$$\text{Car}_R = \lambda_{x_1 \dots x_p} \begin{cases} 1 & \text{si } (x_1, \dots, x_p) \text{ vérifie } R, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

CHAPITRE I

Fonctions récursives

Récurtivité des relations

Définition :

Soit R une relation définie sur IN^p . R est primitive récursive (respectivement récursive) si sa fonction caractéristique Car_R est primitive récursive (respectivement récursive).

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 5 :

1a) Calculabilité (R ou PR) de $E1 = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ pair}\}$

Solution :

- $\text{Car}_{E1}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in E1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ pair}, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } r2(x) = 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
 $= \overline{Sg}(r2(x))$
 $= (\overline{Sg} \circ r2)(x)$
- Car_{E1} PR (règle de composition)
- donc $E1$ calculable (PR)
- donc $E1$ décidable

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 5 :

1b) Calculabilité (R ou PR) de $E2 = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ impair}\}$

Solution :

- $\text{Car}_{E2}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in E2, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ impair,} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } r2(x) = 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = r2(x)$
- Car_{E2} PR
- donc $E2$ calculable (PR)
- donc $E2$ décidable

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 5 :

2a) R et S récursifs. Montrer que $R \cap S$ est décidable.

Solution :

- $$\begin{aligned} \text{Car}_{R \cap S}(x) &= \begin{cases} 1 & \text{si } x \in R \cap S, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } \text{Car}_R(x) = 1 \text{ et } \text{Car}_S(x) = 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } \text{Car}_R(x) * \text{Car}_S(x) = 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \text{Car}_R(x) * \text{Car}_S(x) \\ &= [\otimes^\circ(\text{Car}_R, \text{Car}_S)](x) \end{aligned}$$

- $\text{Car}_{R \cap S}$ récursive (règle de composition)
- donc $R \cap S$ calculable (récursif)
- donc $R \cap S$ décidable

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 5 :

2b) R et S récursifs. Montrer que $R \cup S$ est décidable.

Solution :

$$\begin{aligned} \bullet \quad \text{Car}_{R \cup S}(x) &= \begin{cases} 1 & \text{si } x \in R \cup S, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin R \cup S, \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } \text{Car}_R(x) = 0 \text{ et } \text{Car}_S(x) = 0, \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } \text{Car}_R(x) + \text{Car}_S(x) = 0, \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} = \text{Sg}(\text{Car}_R(x) + \text{Car}_S(x)) \end{aligned}$$

$$= [\text{Sg}^\circ(\oplus^\circ(\text{Car}_R, \text{Car}_S))](x)$$

- $\text{Car}_{R \cup S}$ récursive (règle de composition)
- donc $R \cup S$ calculable (récursif)
- donc $R \cup S$ décidable

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 6 :

1a) Montrer que la relation binaire Equal est PR.

Solution :

- $$\begin{aligned}\text{Car}_{\text{Equal}}(x,y) &= \begin{cases} 1 & \text{si } (x,y) \text{ vérifie Equal,} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } x = y, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } x - y = 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \overline{Sg}(\text{Abs}(x,y)) = [\overline{Sg} \circ \text{Abs}](x,y)\end{aligned}$$

- $\text{Car}_{\text{Equal}}$ PR (règle de composition)
- donc Equal PR

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 6 :

1b) Montrer que la relation binaire d'inégalité linéaire $\leq$ est PR.

Solution :

- $\text{Car}_{\leq}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } (x,y) \text{ vérifie } \leq, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
 $= \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq y, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
 $= \begin{cases} 1 & \text{si } \text{moins}(x,y) = 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
 $= \overline{Sg}(\text{moins}(x,y)) = [\overline{Sg} \circ \text{moins}](x,y)$
- $\text{Car}_{\leq}$ PR (règle de composition)
- donc $\leq$ PR

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 6 :

2a) R1 et R2 relations binaires PR. Montrer que $R1 \wedge R2$ est PR.

Solution :

- $$\begin{aligned} \text{Car}_{R1 \wedge R2}(x,y) &= \begin{cases} 1 & \text{si } (x,y) \text{ vérifie } R1 \wedge R2, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } (x,y) \text{ vérifie } R1 \text{ et } (x,y) \text{ vérifie } R2, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } \text{Car}_{R1}(x,y) = 1 \text{ et } \text{Car}_{R2}(x,y) = 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } \text{Car}_{R1}(x,y) * \text{Car}_{R2}(x,y) = 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \text{Car}_{R1}(x,y) * \text{Car}_{R2}(x,y) = [\otimes(\text{Car}_{R1}, \text{Car}_{R2})](x,y) \end{aligned}$$
- $\text{Car}_{R1 \wedge R2}$ PR (règle de composition)
- donc $R1 \wedge R2$ PR

CHAPITRE I

Fonctions récursives

TD 2 Exercice 6 :

2b) R relation binaire PR. Montrer que $\neg R$ est PR.

Solution :

- $$\begin{aligned} \text{Car}_{\neg R}(x,y) &= \begin{cases} 1 & \text{si } (x,y) \text{ vérifie } \neg R, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } (x,y) \text{ ne vérifie pas } R, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } \text{Car}_R(x,y) = 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \overline{Sg}(\text{Car}_R(x,y)) = [\overline{Sg} \circ \text{Car}_R](x,y) \end{aligned}$$

- $\text{Car}_{\neg R}$ PR (règle de composition)
- Donc $\neg R$ PR