

Série d'exercices n° 6 : Théorème des résidus**Exercice 1 :**

Trouver les résidus de **(a)**  $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)}$  et **(b)**  $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$  en tous les pôles à distance finie.

**Solution.**

**(a)**  $f(z)$  possède un pôle double en  $z = -1$  et des pôles simples en  $z = \pm 2i$ .

Le résidu en  $z = -1$  est

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left\{ (z+1)^2 \cdot \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)} \right\} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z^2+4)(2z-2) - (z^2-2z)(2z)}{(z^2+4)^2} = -\frac{14}{25}.$$

Le résidu en  $z = 2i$  est

$$\lim_{z \rightarrow 2i} \left\{ (z-2i) \cdot \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+2i)(z-2i)} \right\} = \frac{-4-4i}{(2i+1)^2(4i)} = \frac{7+i}{25}.$$

Le résidu en  $z = -2i$  est

$$\lim_{z \rightarrow -2i} \left\{ (z+2i) \cdot \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+2i)(z-2i)} \right\} = \frac{-4+4i}{(-2i+1)^2(-4i)} = \frac{7-i}{25}.$$

**(b)**  $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$  possède des pôles doubles en  $z = 0, \pm\pi, \pm2\pi$ , i.e.  $z = m\pi, m \in \mathbb{Z}$ .

**Méthode 1.**

Le résidu en  $z = m\pi$  est

$$\lim_{z \rightarrow m\pi} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left\{ (z-m\pi)^2 \frac{e^z}{\sin^2 z} \right\} = \lim_{z \rightarrow m\pi} \frac{e^z [(z-m\pi)^2 \sin z + 2(z-m\pi) \sin z - 2(z-m\pi)^2 \cos z]}{\sin^3 z}$$

En posant  $z - m\pi = u$  ou  $z = u + m\pi$ , cette limite peut être écrite sous la forme

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^{u+m\pi} [u^2 \sin u + 2u \sin u - 2u^2 \cos u]}{\sin^3 u} = e^{m\pi} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u^2 \sin u + 2u \sin u - 2u^2 \cos u}{\sin^3 u} = e^{m\pi}.$$

**Méthode 2.** (à l'aide des séries de Laurent)

Cette méthode consiste à développer  $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$  en série de Laurent dans le voisinage de  $z = m\pi$  et à chercher le coefficient de  $\frac{1}{z-m\pi}$  qui est le résidu demandé. On pose pour

simplifier les calculs,  $z = u + m\pi$ . On doit alors développer la fonction en série de Laurent dans le voisinage de  $u = 0$  ; la fonction considérée prend alors la forme  $\frac{e^{m\pi u}}{\sin^2(m\pi + u)} = e^{m\pi} \frac{e^u}{\sin^2 u}$ . À l'aide des développements de Maclaurin de  $e^u$  et  $\sin u$  on trouve par division

$$\begin{aligned} e^{m\pi} \frac{e^u}{\sin^2 u} &= e^{m\pi} \frac{1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots}{\left(u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \dots\right)^2} = e^{m\pi} \frac{1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots}{u^2 \left(1 - \frac{u^2}{3!} + \frac{u^4}{5!} - \dots\right)^2} \\ &= e^{m\pi} \frac{1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots}{u^2 \left(1 - \frac{u^2}{3} + \frac{2u^4}{45} - \dots\right)} = e^{m\pi} \left( \frac{1}{u^2} + \frac{1}{u} + \frac{5}{6} + \frac{u}{3} + \dots \right), \end{aligned}$$

le résidu est donc  $e^{m\pi}$ .

=====

## Exercice 2 :

Calculer  $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$  le long du cercle  $C$  d'équation **(a)**  $|z| = 3$  et **(b)**  $|z| = 1$ .

**Solution.**

**(a)** La fonction à intégrer  $\frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)}$  possède un pôle double  $z = 0$  et deux pôles simples en  $z = -1 \pm i$  [ racines de  $z^2 + 2z + 2$  ]. Tous ces pôles sont intérieurs à  $C : |z| = 3$ .

Le résidu en  $z = 0$  est

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left\{ z^2 \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} \right\} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z^2 + 2z + 2) e^z - e^z (2z + 2)}{(z^2 + 2z + 2)^2} = 0.$$

Le résidu en  $z = -1 + i$  est

$$\lim_{z \rightarrow -1+i} \left\{ (z - (-1 + i)) \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} \right\} = \lim_{z \rightarrow -1+i} \frac{e^z}{z^2} \lim_{z \rightarrow -1+i} \left\{ \frac{z - (-1 + i)}{(z^2 + 2z + 2)} \right\} = \frac{e^{-1+i}}{(-1 + i)^2} \cdot \frac{1}{2i} = \frac{e^{-1+i}}{4}.$$

Le résidu en  $z = -1 - i$  est

$$\lim_{z \rightarrow -1-i} \left\{ (z - (-1 - i)) \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} \right\} = \lim_{z \rightarrow -1-i} \frac{e^z}{z^2} \lim_{z \rightarrow -1-i} \left\{ \frac{z - (-1 - i)}{(z^2 + 2z + 2)} \right\} = \frac{e^{-1-i}}{(-1 - i)^2} \cdot \frac{1}{-2i} = \frac{e^{-1-i}}{4}.$$

On a alors par le théorème des résidus

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz &= \text{somme des résidus intérieur à } |z| = 3. \\ &= 0 + \frac{e^{-1+i}}{4} + \frac{e^{-1-i}}{4} = \frac{e^{-1}}{2} \cos(1). \end{aligned}$$

**(b)** Le seul pôle intérieur à  $|z| = 1$  est  $z = 0$ . Puisque le résidu en  $z = 0$  est 0, on a donc

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz = 0.$$

### Exercice 3 :

Evaluer (a)  $\int_0^{\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx$  et (b)  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2 (x^2 + 2x + 2)} dx$ .

**Solution.**

(a)

On considère  $\int_C \frac{1}{z^6 + 1} dz$ , où  $C$  désigne le contour fermé de la figure ci-contre formé du segment,  $[-R, +R]$  et du demi cercle  $\Gamma$  décrit dans le sens direct.




Figure 1.

Puisque  $z^6 + 1 = 0$  pour  $z = e^{\frac{\pi i}{6}}, e^{\frac{3\pi i}{6}}, e^{\frac{5\pi i}{6}}, e^{\frac{7\pi i}{6}}, e^{\frac{9\pi i}{6}}, e^{\frac{11\pi i}{6}}$ , ces valeurs de  $z$  sont les pôles simples de  $\frac{1}{z^6 + 1}$ . Seuls les pôles  $e^{\frac{\pi i}{6}}, e^{\frac{3\pi i}{6}}$  et  $e^{\frac{5\pi i}{6}}$  sont à l'intérieur de  $C$  d'où en utilisant la règle de L'Hospital :

$$\begin{aligned} \text{Résidu en } e^{\frac{\pi i}{6}} &= \lim_{z \rightarrow e^{\frac{\pi i}{6}}} \left\{ \left( z - e^{\frac{\pi i}{6}} \right) \frac{1}{z^6 + 1} \right\} = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{\pi i}{6}}} \frac{1}{6z^5} = \frac{1}{6} e^{\frac{-5\pi i}{6}}, \\ \text{Résidu en } e^{\frac{3\pi i}{6}} &= \lim_{z \rightarrow e^{\frac{3\pi i}{6}}} \left\{ \left( z - e^{\frac{3\pi i}{6}} \right) \frac{1}{z^6 + 1} \right\} = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{3\pi i}{6}}} \frac{1}{6z^5} = \frac{1}{6} e^{\frac{-5\pi i}{2}}, \\ \text{Résidu en } e^{\frac{5\pi i}{6}} &= \lim_{z \rightarrow e^{\frac{5\pi i}{6}}} \left\{ \left( z - e^{\frac{5\pi i}{6}} \right) \frac{1}{z^6 + 1} \right\} = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{5\pi i}{6}}} \frac{1}{6z^5} = \frac{1}{6} e^{\frac{-25\pi i}{2}}. \end{aligned}$$

D'où

$$\int_C \frac{1}{z^6 + 1} dz = 2\pi i \left\{ \frac{1}{6} e^{\frac{-5\pi i}{6}} + \frac{1}{6} e^{\frac{-5\pi i}{2}} + \frac{1}{6} e^{\frac{-25\pi i}{2}} \right\} = \frac{2\pi}{3},$$

i.e.

$$\int_{-R}^R \frac{1}{x^6 + 1} dx + \int_{\Gamma} \frac{1}{z^6 + 1} dz = \frac{2\pi}{3}. \quad (1)$$

Si l'on prend la limite des deux membres de (1) quand  $R \rightarrow \infty$  et si l'on utilise le fait que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} \frac{1}{z^6 + 1} dz = \int_0^{\pi} \frac{1}{(R e^{i\theta})^6 + 1} R i e^{i\theta} d\theta = 0,$$

$$\text{on obtient } \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{1}{x^6 + 1} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx = \frac{2\pi}{3}.$$

$$\text{Noter que } \int_0^{\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx = \frac{\pi}{3}.$$

(b) Les pôles de  $\frac{z^2}{(z^2+1)^2(z^2+2z+2)}$  situés à l'intérieur du contour  $C$  de la figure 1 de (a) sont  $z = i$  d'ordre 2 et  $z = -1 + i$  d'ordre 1.

Le résidu en  $z = i$  est

$$\lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left\{ (z-i)^2 \frac{z^2}{(z-i)^2(z+i)^2(z^2+2z+2)} \right\} = \frac{-12+9i}{100}.$$

Le résidu en  $z = -1 + i$  est

$$\lim_{z \rightarrow -1+i} \left\{ (z-(-1+i)) \frac{z^2}{(z^2+1)^2(z-(-1+i))(z-(-1-i))} \right\} = \frac{3-4i}{25}.$$

D'où

$$\oint_C \frac{z^2}{(z^2+1)^2(z^2+2z+2)} dz = 2\pi i \left\{ \frac{-12+9i}{100} + \frac{3-4i}{25} \right\} = \frac{7\pi}{50}$$

ou

$$\int_{-R}^R \frac{x^2}{(x^2+1)^2(x^2+2x+2)} dx + \int_{\Gamma} \frac{z^2}{(z^2+1)^2(z^2+2z+2)} dz = \frac{7\pi}{50}.$$

En prenant la limite de ces expressions quand  $R \rightarrow \infty$  et en remarquant que la deuxième intégrale tend vers 0

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} \frac{z^2}{(z^2+1)^2(z^2+2z+2)} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{(Re^{i\theta})^2}{\left((Re^{i\theta})^2+1\right)^2 \left((Re^{i\theta})^2+2Re^{i\theta}+2\right)} Re^{i\theta} d\theta = 0,$$

nous obtenons le résultat demandé. i.e.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2(x^2+2x+2)} dx = \frac{7\pi}{50}.$$

#### =====

**Exercice 4 :**

Evaluer (a)  $\int_0^{2\pi} \frac{1}{3-2\cos\theta+\sin\theta} d\theta$  et (b)  $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2+\sin\theta} d\theta$ .

**Solution.**

(a) Soit  $z = e^{i\theta}$ . D'où  $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i}$ ,  $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2}$ ,  $dz = izd\theta$  et

alors

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{3-2\cos\theta+\sin\theta} d\theta = \oint_C \frac{1}{3-2\frac{z+z^{-1}}{2}+\frac{z-z^{-1}}{2i}} \frac{dz}{iz} = \oint_C \frac{2}{(1-2i)z^2+6iz-1-2i} dz$$

où  $C$  est le cercle de rayon 1 centré à l'origine.

Les pôles de  $\frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - 1 - 2i}$  sont les pôles simples

$$z = \frac{-6i \pm \sqrt{(6i)^2 - 4(1-2i)(-1-2i)}}{2(1-2i)} = \frac{-6i \pm 4i}{2(1-2i)} = 2-i \text{ ou } \frac{2-i}{5}.$$

Seul  $\frac{2-i}{5}$  est à l'intérieur de  $C$ .

Le résidu en  $\frac{2-i}{5}$  est

$$\lim_{z \rightarrow \frac{2-i}{5}} \left\{ \left( z - \frac{2-i}{5} \right) \frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - 1 - 2i} \right\} = \lim_{z \rightarrow \frac{2-i}{5}} \frac{2}{2(1-2i)z + 6i} = \frac{1}{2i}$$

d'après la règle de L'Hospital.

D'où  $\oint_C \frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - 1 - 2i} dz = 2\pi i \frac{1}{2i} = \pi$ , qui est la valeur demandée.

(b) On pose  $z = e^{i\theta}$ . D'où  $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i}$ ,  $dz = ie^{i\theta} dz = iz d\theta$  et donc

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin \theta} d\theta = \oint_C \frac{1}{2 + \frac{z - z^{-1}}{2i}} \frac{dz}{iz} = \oint_C \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz,$$

où  $C$  est le cercle unité centré à l'origine.

Les pôles de  $\frac{2}{z^2 + 4iz - 1}$  sont obtenus en résolvant  $z^2 + 4iz - 1 = 0$  et sont donnés par

$$z = \frac{-2i \pm \sqrt{(2i)^2 - (-1)(1)}}{1} = -2i \pm \sqrt{-3} = (-2 \pm \sqrt{3})i.$$

Seul  $(-2 + \sqrt{3})i$  est à l'intérieur de  $C$ , car

$$\left| (-2 + \sqrt{3})i \right| = 2 - \sqrt{3} < 1 \text{ et } \left| (-2 - \sqrt{3})i \right| = 2 + \sqrt{3} > 1.$$

Le résidu en  $(-2 + \sqrt{3})i$  est

$$\lim_{z \rightarrow (-2 + \sqrt{3})i} \left\{ \left( z - (-2 + \sqrt{3})i \right) \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} \right\} = \lim_{z \rightarrow (-2 + \sqrt{3})i} \frac{2}{2z + 4i} = \frac{1}{\sqrt{3}i}$$

d'après la règle de L'Hospital.

D'où  $\oint_C \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz = 2\pi i \frac{1}{\sqrt{3}i} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ , qui est la valeur demandée.

**Exercice 5 :**

Montrer que  $\int_0^{\infty} \frac{\cos(mx)}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}$ ,  $m > 0$ .

**Solution.**

On considère  $\oint_C \frac{e^{imz}}{z^2+1} dz$  où  $C$  est le contour de la figure 1 de l'exercice 3. La fonction à intégrer possède des pôles simples  $z = \pm i$  mais seul  $z = i$  est intérieur à  $C$ .

Le résidu en  $z = i$  est

$$\lim_{z \rightarrow i} \left\{ (z-i) \frac{e^{imz}}{(z-i)(z+i)} \right\} = \frac{e^{-m}}{2i}.$$

D'où

$$\oint_C \frac{e^{imz}}{z^2+1} dz = 2\pi i \left( \frac{e^{-m}}{2i} \right) = \pi e^{-m}$$

ou

$$\int_{-R}^R \frac{e^{imx}}{x^2+1} dx + \int_{\Gamma} \frac{e^{imz}}{z^2+1} dz = \pi e^{-m}$$

i.e.

$$\int_{-R}^R \frac{\cos mx}{x^2+1} dx + i \int_{-R}^R \frac{\sin mx}{x^2+1} dx + \int_{\Gamma} \frac{e^{imz}}{z^2+1} dz = \pi e^{-m}.$$

Puisque

$$\int_{-R}^R \frac{\sin mx}{x^2+1} dx = 0 \text{ et } \int_{-R}^R \frac{\cos mx}{x^2+1} dx = 2 \int_0^R \frac{\cos mx}{x^2+1} dx,$$

on aura

$$2 \int_0^R \frac{\cos mx}{x^2+1} dx + \int_{\Gamma} \frac{e^{imz}}{z^2+1} dz = \pi e^{-m}.$$

Si l'on fait tendre  $R$  vers  $\infty$  et si l'on utilise le fait que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} \frac{e^{imz}}{z^2+1} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{e^{imR e^{i\theta}}}{(R e^{i\theta})^2 + 1} d\theta = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{e^{imR \cos \theta} e^{-mR \sin \theta}}{(R e^{i\theta})^2 + 1} d\theta = 0,$$

on obtient le résultat demandé. i.e.  $\int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}$ .

=====

**Exercice 6 :**

Montrer que  $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ .

### Solution.

La méthode de l'exercice 5 nous conduit à considérer l'intégrale de  $\frac{e^{iz}}{z}$  le long du contour de la figure 1 page 3. Toutefois étant donné que  $z = 0$  appartient au contour d'intégration et qu'une singularité ne peut appartenir à un tel contour, on modifie celui-ci en évitant le point  $z = 0$  comme il est montré à la figure 2 ci-contre ; on obtient ainsi le contour  $C'$  ou  $ABDEFGHJA$ .




Figure 2.

Le point  $z = 0$  étant à l'extérieur de  $C'$ , on a  $\oint_{C'} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$

ou

$$\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{HJA} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{BDEFG} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

En changeant  $x$  en  $-x$  dans la première intégrale et en combinant avec la troisième, on trouve

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx + \int_{HJA} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{BDEFG} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$

ou

$$2i \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx = - \int_{HJA} \frac{e^{iz}}{z} dz - \int_{BDEFG} \frac{e^{iz}}{z} dz. \quad (2)$$

On fait tendre  $\varepsilon \rightarrow 0$  et  $R \rightarrow \infty$ . La deuxième intégrale du second membre tend vers zéro car

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{BDEFG} \frac{e^{iz}}{z} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{e^{iR(\cos \theta + i \sin \theta)}}{R e^{i\theta}} R i e^{i\theta} d\theta = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} i e^{iR \cos \theta} e^{-R \sin \theta} d\theta = 0.$$

Si l'on pose  $z = \varepsilon e^{i\theta}$  dans la première intégrale du deuxième membre de (2), on voit que sa limite est

$$- \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{HJA} \frac{e^{iz}}{z} dz = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\pi}^0 \frac{e^{i\varepsilon e^{i\theta}}}{\varepsilon e^{i\theta}} i \varepsilon e^{i\theta} d\theta = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\pi}^0 i e^{i\varepsilon e^{i\theta}} d\theta = \pi i$$

par passage à la limite sous le symbole d'intégration.

On a donc

$$\lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow \infty}} 2i \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx = \pi i \quad \text{ou} \quad \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

**Exercice 7 :**

Montrer que  $\int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}, \quad 0 < p < 1.$

**Solution.**

Considérons  $\oint_C \frac{z^{p-1}}{1+z} dz$ . Le point  $z = 0$  étant un point de branchement, on utilisera le contour  $C$  de la figure 3 ci-contre où l'axe réel positif est la coupure et où  $AB$  et  $GH$  coïncident avec l'axe des  $x$  mais sont montrés séparés pour une meilleure compréhension.

La fonction que l'on intègre a un pôle simple  $z = -1$  intérieur à  $C$ .

Le résidu en  $z = -1$  est

$$\lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{z^{p-1}}{1+z} = (-1)^{p-1} = (e^{\pi i})^{p-1} = e^{(p-1)\pi i}.$$

On a donc  $\oint_C \frac{z^{p-1}}{1+z} dz = 2\pi i e^{(p-1)\pi i}$  ou

$$\int_{AB} \frac{z^{p-1}}{1+z} dz + \int_{BDEFG} \frac{z^{p-1}}{1+z} dz + \int_{GH} \frac{z^{p-1}}{1+z} dz + \int_{HJA} \frac{z^{p-1}}{1+z} dz = 2\pi i e^{(p-1)\pi i}.$$

On peut donc écrire

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{x^{p-1}}{1+x} dx + \int_0^{2\pi} \frac{(R e^{i\theta})^{p-1}}{1 + R e^{i\theta}} i R e^{i\theta} d\theta + \int_R^{\varepsilon} \frac{(x e^{2\pi i})^{p-1}}{1 + x e^{2\pi i}} dx + \int_{2\pi}^0 \frac{(\varepsilon e^{i\theta})^{p-1}}{1 + \varepsilon e^{i\theta}} i \varepsilon e^{i\theta} d\theta = 2\pi i e^{(p-1)\pi i},$$

où l'on a posé  $z = x e^{2\pi i}$  pour l'intégrale le long de  $GH$ , l'argument de  $z$  ayant augmenté de  $2\pi$  en parcourant le cercle  $BDEFG$ .

Si l'on prend la limite quand  $\varepsilon \rightarrow 0$  et  $R \rightarrow \infty$ , remarquant que la deuxième et la quatrième intégrales tendent vers zéro, on trouve

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx + \int_{\infty}^0 \frac{e^{2\pi i(p-1)} x^{p-1}}{1+x} dx = 2\pi i e^{(p-1)\pi i}$$




Figure 3.

ou

$$(1 - e^{2\pi i(p-1)}) \int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = 2\pi i e^{(p-1)\pi i}$$

si bien que

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \frac{2\pi i e^{(p-1)\pi i}}{1 - e^{2\pi i(p-1)}} = \frac{2\pi i}{e^{-(p-1)\pi i} - e^{\pi i(p-1)}} = \frac{2\pi i}{e^{-p\pi i} e^{\pi i} - e^{\pi i p} e^{-\pi i}} = \frac{2\pi i}{e^{\pi i p} - e^{-p\pi i}} = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}.$$

### Exercice 8 :

$$\text{Montrer que } \int_0^\infty \frac{\operatorname{ch}(ax)}{\operatorname{ch} x} dx = \frac{\pi}{2 \cos\left(\frac{\pi a}{2}\right)}, \quad \text{où } |a| < 1.$$

### Solution.

Considérons  $\int_C \frac{e^{az}}{\operatorname{ch} z} dz$  où  $C$  est un rectangle de sommets  $-R, R, R + \pi i, -R + \pi i$ , voir figure 4 ci-contre. Les pôles de  $\frac{e^{az}}{\operatorname{ch} z}$  sont simples et sont obtenus pour  $\operatorname{ch} x = 0$ , i.e.  $z = \left(k + \frac{1}{2}\right) \pi i, k \in \mathbb{Z}$ . Le seul pôle situé à l'intérieur de  $C$  est  $\frac{i\pi}{2}$ .




Figure 4.

Le résidu de  $\frac{e^{az}}{\operatorname{ch} z}$  en  $z = \frac{i\pi}{2}$  est

$$\lim_{z \rightarrow \frac{i\pi}{2}} \left( z - \frac{i\pi}{2} \right) \frac{e^{az}}{\operatorname{ch} z} = \frac{e^{a \frac{i\pi}{2}}}{\operatorname{sh} \left( \frac{i\pi}{2} \right)} = \frac{e^{a \frac{i\pi}{2}}}{i \sin \frac{\pi}{2}} = -i e^{a \frac{i\pi}{2}}.$$

On a donc d'après le théorème des résidus,

$$\int_C \frac{e^{az}}{\operatorname{ch} z} dz = 2\pi i \left( -i e^{a \frac{i\pi}{2}} \right) = 2\pi e^{a \frac{i\pi}{2}},$$

ce qui peut s'écrire

$$\int_{-R}^R \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx + \int_0^\pi \frac{e^{a(R+iy)}}{\operatorname{ch}(R+iy)} i dy + \int_R^{-R} \frac{e^{a(x+\pi i)}}{\operatorname{ch}(x+\pi i)} dx + \int_\pi^0 \frac{e^{a(-R+iy)}}{\operatorname{ch}(-R+iy)} i dy = 2\pi e^{a \frac{i\pi}{2}}. \quad (3)$$

Quand  $R \rightarrow \infty$  la deuxième et la quatrième intégrale du premier membre tendent vers zéro.

Pour montrer cela considérons la deuxième intégrale ; de

$$|\operatorname{ch}(R+iy)| = \left| \frac{e^{R+iy} + e^{-R-iy}}{2} \right| \geq \frac{1}{2} \{ |e^{R+iy}| - |e^{-R-iy}| \} = \frac{1}{2} (e^R - e^{-R}) \geq \frac{1}{4} e^R,$$

on déduit

$$\left| \int_0^\pi \frac{e^{a(R+iy)}}{\operatorname{ch}(R+iy)} i dy \right| \leq \int_0^\pi \frac{e^{aR}}{\frac{1}{4}e^R} dy = 4\pi e^{(a-1)R}$$

et le résultat en découle si l'on remarque que le second membre tend vers zéro quand  $R \rightarrow \infty$  car  $|a| < 1$ .

De la même façon on peut montrer que la quatrième intégrale du premier membre de (3) tend vers zéro quand  $R \rightarrow \infty$ . L'égalité (3) devient alors

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left\{ \int_{-R}^R \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx + e^{a\pi i} \int_{-R}^R \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx \right\} = 2\pi e^{a \frac{i\pi}{2}}$$

ou

$$(1 + e^{a\pi i}) \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx = 2\pi e^{a \frac{i\pi}{2}}$$

car  $\operatorname{ch}(x + \pi i) = \operatorname{ch} x$ . On a donc

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx = \frac{2\pi e^{a \frac{i\pi}{2}}}{1 + e^{a\pi i}} = \frac{2\pi}{e^{-a \frac{i\pi}{2}} + e^{a \frac{i\pi}{2}}} = \frac{\pi}{\cos\left(\frac{\pi a}{2}\right)}.$$

De

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx + \int_0^{\infty} \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx = \frac{\pi}{\cos\left(\frac{\pi a}{2}\right)}$$

on tire en changeant  $x$  en  $-x$  dans la première intégrale

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax}}{\operatorname{ch} x} dx + \int_0^{\infty} \frac{e^{ax}}{\operatorname{ch} x} dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{ch}(ax)}{\operatorname{ch} x} dx = \frac{\pi}{\cos\left(\frac{\pi a}{2}\right)},$$

d'où l'on déduit le résultat cherché.

### Exercice 9 :

Démontrer que  $\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{Log}(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx = \pi \operatorname{Log} 2$ .

**Solution.**

On considère  $\oint_C \frac{\operatorname{Log}(z+i)}{z^2+1} dz$  le long du contour  $C$  formé d'une portion de l'axe réel de  $-R$  à  $R$  et du demi-cercle  $\Gamma$  de rayon  $R$ , voir figure 5 ci-contre. Le seul pôle de  $\frac{\operatorname{Log}(z+i)}{z^2+1}$




Figure 5.

intérieur à  $C$  est le pôle simple  $z = i$ , et le résidu est

$$\lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{\text{Log}(z + i)}{(z - i)(z + i)} = \frac{\text{Log}(2i)}{2i}.$$

On a donc d'après le théorème des résidus

$$\oint_C \frac{\text{Log}(z + i)}{z^2 + 1} dz = 2\pi i \text{Res}(f, i) = 2\pi i \left( \frac{\text{Log}(2i)}{2i} \right) = \pi \text{Log}(2i) = \pi \ln(2) + \frac{1}{2}\pi^2 i,$$

en utilisant la détermination principale du logarithme. Ce résultat peut s'écrire sous la forme

$$\int_{-R}^R \frac{\text{Log}(x + i)}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma} \frac{\text{Log}(z + i)}{z^2 + 1} dz = \pi \ln(2) + \frac{1}{2}\pi^2 i$$

ou

$$\int_{-R}^0 \frac{\text{Log}(x + i)}{x^2 + 1} dx + \int_0^R \frac{\text{Log}(x + i)}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma} \frac{\text{Log}(z + i)}{z^2 + 1} dz = \pi \ln(2) + \frac{1}{2}\pi^2 i.$$

En changeant  $x$  en  $-x$  dans la première intégrale, on obtient

$$\int_0^R \frac{\text{Log}(i - x)}{x^2 + 1} dx + \int_0^R \frac{\text{Log}(i + x)}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma} \frac{\text{Log}(z + i)}{z^2 + 1} dz = \pi \ln(2) + \frac{1}{2}\pi^2 i,$$

où puisque  $\text{Log}(i - x) + \text{Log}(i + x) = \text{Log}(i^2 - x^2) = \text{Log}(x^2 + 1) + \pi i$ ,

$$\int_0^R \frac{\text{Log}(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx + \int_0^R \frac{\pi i}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma} \frac{\text{Log}(z + i)}{z^2 + 1} dz = \pi \ln(2) + \frac{1}{2}\pi^2 i.$$

Quand  $R \rightarrow \infty$  l'intégrale le long de  $\Gamma$  tend vers zéro car

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_{\Gamma} \frac{\text{Log}(z + i)}{z^2 + 1} dz \right| = \lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_0^{\pi} \frac{\text{Log}(R e^{it} + i)}{R^2 e^{2it} + 1} R i e^{it} dt \right| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \left| 4\pi \frac{\text{Log}(R + 1) + 2\pi}{R^2 - 1} R \right| = 0.$$

On a alors en prenant les parties réelles et imaginaires

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\text{Log}(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx = \int_0^{\infty} \frac{\text{Log}(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx = \pi \ln 2.$$