

Test n°1 - 06 novembre 2014. Durée : 30 minutes

Nom : Matricule :

Prénom : Groupe :

Exercice 1 (5 pts.) : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Comparer $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Réponse.

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$ on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{(x^2 + y^2) \frac{d}{dx}(xy(x^2 - y^2)) - (xy(x^2 - y^2)) \frac{d}{dx}(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{(x^2 + y^2)(3yx^2 - y^3) - (yx^3 - xy^3)(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{(x^2 + y^2) \frac{d}{dy}(xy(x^2 - y^2)) - (xy(x^2 - y^2)) \frac{d}{dy}(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{(x^2 + y^2)(x^3 - 3xy^2) - (yx^3 - xy^3)(2y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-x(y^4 + 4x^2y^2 - x^4)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Pour $(x, y) = (0, 0)$ on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0.$$

Alors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{-x(y^4 + 4x^2y^2 - x^4)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Pour les dérivées partielles secondes croisées on a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^5}{x^4} - 0}{x} = 1$$

et

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{-y^5}{y^4} - 0}{y} = -1.$$

D'où $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

=====

Exercice 2 (6 pts.) :

1) À l'aide du changement $\xi = x + y$, $\eta = x - y$ transformer l'équation $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 1$ en une équation de la forme $\frac{\partial f}{\partial \eta} = a$, ($a \in \mathbb{R}$).

2) Trouver toutes les fonctions de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R} qui vérifient $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 1$.

=====

Réponse.

1) Comme $\frac{\partial \xi}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial \eta}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial \xi}{\partial y} = 1$ et $\frac{\partial \eta}{\partial y} = -1$, alors

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial \eta}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial \xi} - \frac{\partial f}{\partial \eta}.$$

Il vient alors que

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = \left(\frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial \eta} \right) - \left(\frac{\partial f}{\partial \xi} - \frac{\partial f}{\partial \eta} \right) = 2 \frac{\partial f}{\partial \eta}.$$

D'où $\frac{\partial f}{\partial \eta} = \frac{1}{2}$.

2) En intégrant par rapport à η on obtient $f(\xi, \eta) = \frac{1}{2}\eta + g(\xi)$ où g est une fonction réelle quelconque d'une variable réelle.

Par conséquent $f(x, y) = \frac{1}{2}(x - y) + g(x + y)$.

=====

Exercice 3 (4 pts.) : Écrire le développement de Taylor à l'ordre 2 au voisinage du point $(0, 0)$ pour la fonction f définie par $f(x, y) = e^x (1 + \sin y)$.

=====

Réponse.

Le développement de Taylor d'ordre 2 d'une fonction de plusieurs variables de classe \mathcal{C}^2 est

$$f(a + h) = f(a) + h \cdot \nabla f(a) + \frac{1}{2} h^T H(a) h + \|h\|^2 \varepsilon(h) \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0,$$

et $H = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ est la matrice hessienne de f .

Dans le cas particulier des fonctions de deux variables i.e. $n = 2$, $a = (a_1, a_2)$ et $h = (h_1, h_2)$,

le développement de Taylor d'ordre 2 est donné par la formule

$$f(a + h) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a) h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a) h_2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) h_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) h_1 h_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) h_2^2 \right) + \|h\|^2 \varepsilon(h).$$

Dans notre cas on a

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= e^x (1 + \sin y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = e^x \cos y, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = e^x \cos y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = e^x (1 + \sin y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -e^x \sin y. \end{aligned}$$

Il vient

$$f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0.$$

D'où

$$f(h_1, h_2) = 1 + h_1 + h_2 + \frac{1}{2} (h_1^2 + 2h_1 h_2) + \|h\|^2 \varepsilon(h).$$