

Épreuve de TD (interrogation) - 15 avril 2012. Durée : 45 minutes

Nom : Matricule :

Prénom : Groupe :

=====

Exercice 1 (4 points) : Calculer $i \operatorname{Log} i$.

Réponse.

$$i \operatorname{Log} i = i \{ \ln |i| + i \arg i \}$$

$$= i \{ \ln 1 + i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) \} = - \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), k \in \mathbb{Z}.$$

=====

Exercice 2 (4 points) : Déterminer $u(x, y)$ et $v(x, y)$ telles que $f(z) = z^2 + i \bar{z} = u + iv$.

Réponse.

On a

$$\begin{aligned} f(z) = z^2 + i \bar{z} &= (x + iy)^2 + i(x - iy) = x^2 - y^2 + 2ixy + ix + y \\ &= x^2 - y^2 + y + i(2xy + x). \end{aligned}$$

Alors $u(x, y) = x^2 - y^2 + y$ et $v(x, y) = 2xy + x$.

=====

Exercice 3 (6 pts) : Examiner si la fonction $f(z) = x + e^x \cos y + i(y + e^x \sin y)$ est holomorphe dans \mathbb{C} .

Réponse.

Si les dérivées partielles sont continues dans le domaine indiqué, les équations de Cauchy-Riemann $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ et $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ sont nécessaires et suffisantes pour que $f = u + iv$ soit holomorphe.

On a $u = x + e^x \cos y$ et $v = y + e^x \sin y$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 + e^x \cos y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 1 + e^x \cos y \quad \rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y \quad \rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Les équations de Cauchy-Riemann sont satisfaites, la fonction f est donc holomorphe sur \mathbb{C} .

Exercice 4 (6 points) : Calculer $\oint_C (z^3 + \bar{z}) dz$ le long du cercle $|z| = 2$ de $2i$ à -2 dans le sens direct.

Réponse.

L'arc de $2i$ à -2 du cercle $|z| = 2$ peut être paramétré par

$$z = 2e^{it}, \quad t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi \right].$$

Les points $2i$ et -2 sur C correspondant à $\frac{\pi}{2}$ et à π . L'intégrale curviligne considérée vaut donc

$$\begin{aligned} \int_{t=\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left\{ (2e^{it})^3 + 2e^{-it} \right\} (2ie^{it} dt) &= \int_{t=\frac{\pi}{2}}^{\pi} 2ie^{it} (8e^{3it} + 2e^{-it}) dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (16ie^{4it} + 4i) dt = [4e^{4it} + 4it]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\ &= 4e^{4i\pi} + 4i\pi - (4e^{2i\pi} + 2i\pi) = 2i\pi. \end{aligned}$$

Exercice 5 (supplémentaire) (+1 ou 2 points) :

À l'aide du théorème de Cauchy, calculer $\oint_C z dz$ où C désigne le cercle $|z| = 1$.

Réponse.

Le cercle $|z| = 1$ est une courbe fermée simple et la fonction $f(z) = z$ est holomorphe dans $|z| \leq 1$, donc d'après le théorème de Cauchy $\oint_C z dz = 0$.

Nantissement : Sur mon honneur, je n'ai ni donné, ni reçu de l'aide sur ce test. Signé.....