

Nom : ..... Matricule : .....

Prénom : ..... Groupe : .....

Exercice 1 (3 pts.) : Calculer a)  $\text{Log}(1+i)$  b)  $(1+i)^i$ .

Réponse.

$$\text{a) } \text{Log}(1+i) = \ln(|1+i|) + i \arg(1+i) = \ln \sqrt{2} + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{b) } (1+i)^i = e^{i \text{Log}(1+i)} = e^{i(\ln \sqrt{2} + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi))} = e^{i \ln \sqrt{2} - (\frac{\pi}{4} + 2k\pi)}$$

$$= e^{-(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)} (\cos(\ln \sqrt{2}) + i \sin(\ln \sqrt{2})), k \in \mathbb{Z}.$$

Exercice 2 (3 pts.) : Séparer les parties réelle et imaginaire de  $f(z) = \bar{z}^2 - iz$ .

Réponse. On a

$$f(z) = \bar{z}^2 - iz = (x - iy)^2 - i(x + iy) = x^2 - y^2 - 2ixy - ix + y$$

$$= x^2 - y^2 + y + i(-2xy - x).$$

$$\text{Alors } \text{Re}(f(z)) = x^2 - y^2 + y \text{ et } \text{Im}(f(z)) = -2xy - x.$$

Exercice 3 (4 pts.) : Examiner si la fonction  $f(z) = x + 2ye^x + i(y + y^2e^x)$  est holomorphe dans  $\mathbb{C}$ .

Réponse.

Si les dérivées partielles de  $u$  et  $v$  sont continues dans  $\mathbb{C}$ , les équations de Cauchy-Riemann  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$  et  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$  sont nécessaires et suffisantes pour que  $f = u + iv$  soit holomorphe.

On a  $u = x + 2ye^x$  et  $v = y + y^2e^x$ .

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 + 2ye^x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 1 + 2ye^x \quad \rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2e^x, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = y^2e^x \quad \rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial y} \neq -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Les équations de Cauchy-Riemann ne sont pas satisfaites, la fonction  $f$  est donc n'est pas holomorphe sur  $\mathbb{C}$ .

---

---

**Exercice 4 (5 pts.) :** Calculer  $\int_C (\bar{z}^2 + i z) dz$  le long du demi cercle  $|z| = 3$  de 3 à  $-3$  dans le sens direct.

---

---

**Réponse.**


L'arc de 3 à  $-3$  du cercle  $|z| = 3$  peut être paramétré par

$$z = 3e^{it}, \quad t \in [0, \pi].$$

Les points 3 et  $-3$  de l'arc, correspondent respectivement à

$$t = 0 \text{ et } t = \pi.$$

L'intégrale donnée a alors pour valeur



$$\begin{aligned} \int_{t=0}^{\pi} \left\{ (3e^{-it})^2 + 3ie^{it} \right\} d(3e^{it}) &= \int_0^{\pi} (9e^{-2it} + 3ie^{it}) 3ie^{it} dt \\ &= \int_0^{\pi} (27ie^{-it} - 9e^{2it}) dt \\ &= \left[ -27e^{-it} + \frac{9}{2}ie^{2it} \right]_0^{\pi} \\ &= -27e^{-i\pi} + \frac{9}{2}ie^{2i\pi} - \left( -27 + \frac{9}{2}i \right) \\ &= 27 + \frac{9}{2}i + 27 - \frac{9}{2}i = 54. \end{aligned}$$